

MATÉRIAUX POUR LA FAUNE

DES PETITES-ANTILLES

LONGICORNES

RECUEILLIS PAR M. PURVES A ANTIGOA

PAR

Auguste LAMEERE

— SÉANCE DU 2 AOUT 1884 —

FAM. CERAMBYCIDÆ.

1. *Achryson surinamum* Linn. — 1 ex.
2. *Chlorida festiva* Linn. — Nombreux ex.
3. *Eburia decemmaculata* Fab. — Un couple.

4. ***Heterachthes submaculatus*** (Chevrol.) nov. sp.

Elongatus, brunneo-testaceus, pilis brevibus griseis indutus; elytris seriatim punctatis, singulis unispinosi, maculisque duabus albo-testaceis; pedibus fuscis, femorum basi tibiisque, apice excepto, pallidioribus. — Long., 12 à 14 mill.; lat., 2 à 2 4/5 mill.

Hab.: Indiæ occid. — Typi in Mus. reg. Belg. atque nostro, ♂ ♀.

Compsa submaculata Chevrol., Dej., Cat., 3^e édit., p. 358.

— Lacord., Gen. Col., VIII, p. 333, not. 3. — Gemm., Cat. Col., p. 2831.

Allongé, d'un brun testacé, entièrement revêtu d'une fine pubescence grise couchée. Tête marquée d'une rangée de gros points derrière les yeux, un peu dénudée à l'extrémité du vertex; antennes d'un brun noirâtre, cette coloration remplacée progressivement, en allant du troisième article à l'extrémité, par du jaune testacé, le dernier article étant entièrement de cette couleur. Prothorax deux

fois aussi long que large, couvert de quelques points dénudés et orné de deux tubercules dorsaux un peu avant le milieu de sa longueur, entièrement dénudé en dessous. Écusson couvert d'un duvet blanc. Élytres tronquées en arrière, épineuses à l'angle externe, couvertes de gros points dénudés disposés en séries longitudinales et ornées chacune de deux taches ovalaires d'un blanc jaunâtre, l'une au tiers antérieur, l'autre au tiers postérieur. Dessous du corps d'un brun roussâtre brillant, uniformément recouvert de pubescence, un peu dénudé au milieu du métasternum. Fémurs d'un jaune testacé à la base, rembrunis sur la massue; tibias d'un jaune testacé, sauf à l'extrémité, qui est plus foncée; tarses jaunâtres.

M. Purves a recueilli à Antigoa deux exemplaires de cette espèce, qui est également connue de la Guadeloupe.

Un autre *Cerambycidae*, des plus remarquables et qui forme sans doute le type d'un genre nouveau, se trouve parmi les espèces rapportées d'Antigoa par M. Purves, mais je n'ai point voulu le décrire, vu le mauvais état de l'unique exemplaire à ma disposition.

FAM. LAMIIDÆ.

5. *Lagochirus araneiformis* Linn. — 1 ex.

